PAT ver. 4.0とPAT pro ver. 1.0の違いについて

1. 薬物モデルを登録しました。モデルの詳細をご確認の上、注意してご使用ください。

バンコマイシン成人、小児
テイコプラニン成人、小児
アルベカシン成人、小児
アミカシン成人、小児
ゲンタマイシン成人、小児
トブラマイシン成人、小児
バンコマイシン成人のCHDF

2. 投与歴、測定歴をタブで選択することとし、それぞれ30行ずつ入力できることとしました。

それぞれの投与タイミングは日時で入力することとしました。

3. バンコマイシンはCHDF時の増分クリアランスを考慮可能としました。

生理機能の基本的な入力方法は、ver. 4.0のマニュアルをご確認ください。

PAT pro ver. 1.0の使用法～その1：薬物モデルの解説～

1. バンコマイシンの成人、小児 → PAT ver. 4.0と同じものです。

2. テイコプラニンの成人（モデル名：teicoplaninAdult1）

$$CL \text{ (L/h)} = 0.00498 \times \text{Ccr} + 0.00426 \times \text{体重} \text{ 【22.1\%】}$$

$$Vc \text{ (L)} = 10.4 \text{ 【26.7\%】}$$

$$K12 \text{ (/h)} = 0.38 \text{ 【固定値】}$$

$$K21 \text{ (/h)} = 0.0485 \text{ 【24.5\%】}$$

$$\text{残差変動} = 15.6\%$$

Ccr : mL/min、体重 : kg

患者集団：120名のMRSA感染症日本人患者

血中濃度：305点

性別：男性84名（70%）

年齢：75.5（11.6）歳

体重：45.1（8.8）kg

Ccr：49.7（23.8）mL/min

Niwa T, Tabata K, Kimura J, Kamada M, Noda Y, Takagi A. [Development of new software (Ver. 2.0) based on the Bayesian estimation utilized in the therapeutic drug monitoring of teicoplanin, a glycopeptide antibiotic]. Jpn J Antibiot. 2006 Jun;59(3):165-76. Japanese.

3. テイコプラニンの成人（モデル名：teicoplaninAdult.ALB1）

$$CL \text{ (L/h)} = 0.0117 \times \text{Ccr/ALB} + 0.00468 \times \text{体重} \text{ 【22.5\%】}$$

$$Vc \text{ (L)} = 10.3 \text{ 【26.1\%】}$$

$$K12 \text{ (/h)} = 0.384 \text{ 【固定値】}$$

$$K21 \text{ (/h)} = 0.0492 \text{ 【22.6\%】}$$

$$\text{残差変動} = 15.8\%$$

Ccr : mL/min、体重 : kg

患者集団：120名のMRSA感染症日本人患者

血中濃度：305点

性別：男性84名（70%）

年齢：75.5（11.6）歳

体重：45.1（8.8）kg

Ccr：49.7（23.8）mL/min

Niwa T, Tabata K, Kimura J, Kamada M, Noda Y, Takagi A. [Development of new software (Ver. 2.0) based on the Bayesian estimation utilized in the therapeutic drug monitoring of teicoplanin, a glycopeptide antibiotic]. Jpn J Antibiot. 2006 Jun;59(3):165-76. Japanese.

4. テイコプラニンの小児（モデル名：teicoplaninPediatrics1）

$$CL \text{ (L/h)} = 0.99 \times (\text{体重}/70)^{0.75} \times (\text{PMA}^{3.4}/(47.7^{3.4} + \text{PMA}^{3.4})) \times (\text{eGFR}/90)^{0.67} \text{ 【34.2\%】}$$

$$Vc \text{ (L)} = 18.1 \times (\text{体重}/70) \text{ 【25.2\%】}$$

$$K12 \text{ (/h)} = 0.49 * (\text{体重}/70)^{-0.25} \text{ 【固定値】}$$

$$K21 \text{ (/h)} = 0.21 * (\text{体重}/70)^{-0.25} \text{ 【固定値】}$$

$$\text{残差変動} = 7.2\%$$

PMA：最終月経後週数（週）、体重：kg、eGFR：mL/min/1.73m²

患者集団：214名の日本人小児患者
 新生児（生後28日以内）：48名
 幼児（生後28日～2歳未満）：76名
 2歳～17歳：90名
 血中濃度：399点
 性別：男性116名（54.2%）
 体重：0.3-71.8 kg
 eGFR：5-210 mL/min/1.73m²

原文に掲載されている新生児のモデルは登録していません。幼児以降のPMA（最終月経後週数）は、40週で出生したものと年齢より換算しますので、年齢のフィールドにはそのまま小数点で年齢をご入力ください（PMA = 40 + 年齢 × 52）

5. アルベカシンの成人（モデル名：arbekacinAdult1）

$$CL \text{ (L/h)} = (\text{Ccr} < 80) 0.0319 \times \text{Ccr} + (24/\text{年齢})$$

$$(\text{Ccr} > 80) 0.013 \times \text{Ccr} + 0.0342 \times \text{体重} + (26.5/\text{年齢}) \quad \text{【38.8\%】}$$

$$Vc \text{ (L)} = 0.272 \times \text{体重} \quad \text{【37.1\%】}$$

$$Vp \text{ (L)} = 50.6 \quad \text{【167.6\%】}$$

$$Q \text{ (L/h)} = 3.84 \quad \text{【固定値】}$$

$$\text{残差変動} = 1.07 \mu\text{g/mL} \quad \text{Ccr : mL/min、年齢 : 歳、体重 : kg}$$

患者集団：403名のMRSA感染症日本人患者
 血中濃度：353点
 性別：男性 275名（68.2%）
 年齢：61.5（19.1）歳
 体重：54.4（12.7）kg
 Ccr：88.4（60.5）mL/min

Tanigawara Y, Sato R, Morita K, Kaku M, Aikawa N, Shimizu K. Population pharmacokinetics of Arbekacin in patients infected with methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother. 2006 Nov;50(11):3754-62.

6. アルベカシンの小児（モデル名：arbekacinPediatrics1）

$$CL \text{ (L/h)} = 0.146 \times \text{Ln}(\text{体重})/\text{Scr} \quad \text{【35.5\%】}$$

$$Vc \text{ (L)} = (0.334 + 0.141 \times \text{年齢}^{-0.536}) \times \text{体重}$$

$$\text{【42.5\%】}$$

$$\text{残差変動} = 1.22 \mu\text{g/mL}$$

$$\text{Scr : mg/dL、体重 : kg}$$

患者集団：37名の日本人感染症患者
 血中濃度：80点
 性別：男性 21名（56.8%）
 年齢：3.7（4.0）歳、2か月～17歳
 体重：12.4（9.3）kg、3.1～48.4 kg
 Scr：0.3（0.1）mg/dL、0.1～0.4 mg/dL
 ALB：3.4（0.7）g/dL、1.9～4.4 g/dL

木村利美, 国分秀也, 野々山勝人, 島田慈彦, 松浦信夫, 砂川慶介. 小児におけるarbekacinの母集団パラメータ解析. 日本化学療法学会雑誌 2003;51(1):18-23

7. アミカシンの成人（モデル名：amikacinAdult1）

$$\begin{aligned} \text{CL (L/h)} &= \text{Ccr} \times 0.06 \quad \text{【38.8\%】} \\ \text{Vc (L)} &= 0.272 \times \text{体重} \quad \text{【37.1\%】} \\ \text{Vp (L)} &= 50.6 \quad \text{【167.6\%】} \\ \text{Q (L/h)} &= 3.84 \quad \text{【固定値】} \\ \text{残差変動} &= 1.07 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

Ccr : mL/min、体重 : kg

- ✓ クリアランスはクレアチニンクリアランスと同じとした。
- ✓ アルベカシン成人データより、個体間変動、残差変動を外挿

Tanigawara Y, Sato R, Morita K, Kaku M, Aikawa N, Shimizu K. Population pharmacokinetics of Arbekacin in patients infected with methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother. 2006 Nov;50(11):3754-62.

8. アミカシンの小児（モデル名：amikacinPediatrics1）

$$\begin{aligned} \text{CL (L/h)} &= 0.146 \times \text{Ln}(\text{体重}) / \text{Scr} \quad \text{【35.5\%】} \\ \text{Vc (L)} &= (0.334 + 0.141 \times \text{年齢}^{-0.536}) \times \text{体重} \\ &\quad \text{【42.5\%】} \\ \text{残差変動} &= 1.22 \mu\text{g/mL} \quad \rightarrow 5\% \text{に補正} \end{aligned}$$

Scr : mg/dL、体重 : kg

- ✓ アルベカシンデータをそのまま外挿
- ✓ 外挿のため、測定値の重みを増して最小二乗法の概念に近づけて解析

木村利美, 国分秀也, 野々山勝人, 島田慈彦, 松浦信夫, 砂川慶介. 小児におけるarbekacinの母集団パラメータ解析. 日本化学療法学会雑誌 2023;51(1):18-23

9. ゲンタマイシンの成人（モデル名：gentamicinAdult1）

CL (L/h) = 0.047 × Ccr 【29.6%】
 Vc (L) = 0.28 × 体重 【5.8%】
 K12 (/h) = 0.092 【69.9%】
 K21 (/h) = 0.071 【63.9%】
 残差変動 = 23.7% + 0.23 μg/mL

Ccr : mL/min、体重 : kg

患者集団：903名の感染症患者、1日1回投与
 血中濃度：1294点
 性別：男性 508名（54.1%）
 年齢：55（20）歳
 体重：70.2（17.4）kg
 Ccr：92.0（45.2）mL/min

Xuan D, Nicolau DP, Nightingale CH. Population pharmacokinetics of gentamicin in hospitalized patients receiving once-daily dosing. Int J Antimicrob Agents. 2004 Mar;23(3):291-5.

10. ゲンタマイシンの小児（モデル名：gentamicinPediatrics1）

CL (L/h) = 0.146 × Ln(体重) / Scr 【35.5%】
 Vc (L) = (0.334 + 0.141 × 年齢^(-0.536)) × 体重
 【42.5%】
 残差変動 = 1.22 μg/mL → 5%に補正

Scr : mg/dL、体重 : kg

- ✓ アルベカシンデータをそのまま外挿
- ✓ 外挿のため、測定値の重みを増して最小二乗法の概念に近づけて解析

木村利美, 国分秀也, 野々山勝人, 島田慈彦, 松浦信夫, 砂川慶介. 小児におけるarbakacinの母集団パラメータ解析. 日本化学療法学会雑誌 2023;51(1):18-23

11. トブラマイシンの成人（モデル名：tobramycinAdult1）

$CL \text{ (L/h)} = 2.84 \times (\text{体重}/70) \times (\text{eGFR}/90)^{0.568}$ 【31.1%】
 $Vc \text{ (L)} = 26.3 \times (\text{体重}/70)$ 【20.2%】
 残差変動 = 28.8%

eGFR : mL/min/1.73m²、体重 : kg

患者集団：53名のブドウ糖非発酵菌感染症日本人患者
 血中濃度：161点
 性別：男性31名（58.5%）
 年齢：61.9（16.7）歳
 体重：52.2（14.1）kg
 eGFR：123.6（108.9）mL/min/1.73m²

Hashiguchi Y, Matsumoto N, Oda K, Jono H, Saito H. Population Pharmacokinetics and AUC-Guided Dosing of Tobramycin in the Treatment of Infections Caused by Glucose-Nonfermenting Gram-Negative Bacteria. Clin Ther. 2023 May;45(5):400-414.e2.

12. トブラマイシンの小児（モデル名：tobramycinPediatrics1）

$CL \text{ (L/h)} = 0.146 \times \text{Ln}(\text{体重})/\text{Scr}$ 【35.5%】
 $Vc \text{ (L)} = (0.334 + 0.141 \times \text{年齢}^{-0.536}) \times \text{体重}$ 【42.5%】
 残差変動 = 1.22 μg/mL → 5%に補正

Scr : mg/dL、体重 : kg

- ✓ アルベカシンデータをそのまま外挿
- ✓ 外挿のため、測定値の重みを増して最小二乗法の概念に近づけて解析

木村利美, 国分秀也, 野々山勝人, 島田慈彦, 松浦信夫, 砂川慶介. 小児におけるarbakacinの母集団パラメータ解析. 日本化学療法学会雑誌 2023;51(1):18-23

13. バンコマイシン成人のCHDF (GFR保持、モデル名：vancomycinAdult.CHDF1.PreGFR)

$$CL (L/h) = 2.12 + 0.672 \times Q_e \times 0.06 \quad \text{【30.4\%】}$$

$$K_{12} (/hr) = 0.525 \quad \text{【固定値】}$$

$$K_{21} (/hr) = 0.213 \quad \text{【28.6\%】}$$

$$V_{ss} (L) = 91.3 \times (\text{体重}/70) \quad \text{【35.3\%】}$$

残差変動 15.7%

体重：kg、 Q_e ：mL/min

患者集団：持続濾過透析日本人患者 17名

血中濃度：80点

男性：8名 (28.6%)

年齢：64 (19-92) 歳

体重：59.7(43.1-117.0) kg

モダリティ：CHDF 15名、CHD 2名

14. バンコマイシン成人のCHDF (無尿、モデル名：vancomycinAdult.CHDF1.Anuria)

$$CL (L/h) = 0.339 + 0.672 \times Q_e \times 0.06 \quad \text{【30.4\%】}$$

$$K_{12} (/hr) = 0.525 \quad \text{【固定値】}$$

$$K_{21} (/hr) = 0.213 \quad \text{【28.6\%】}$$

$$V_{ss} (L) = 91.3 \times (\text{体重}/70) \quad \text{【35.3\%】}$$

残差変動 15.7%

体重：kg、 Q_e ：mL/min

患者集団：持続濾過透析日本人患者 17名

血中濃度：80点

男性：8名 (28.6%)

年齢：64 (19-92) 歳

体重：59.7(43.1-117.0) kg

モダリティ：CHDF 15名、CHD 2名

PAT pro ver. 1.0の使用方法～その2：投与歴と測定歴～

投与歴

グラフ

投与歴

測定歴

①

投与歴を入力してください。

自動設計（初回のみ）					
投与日 1 ②	③ 投与時間 1 (hh:mm)	実投与量 1 (mg)	点滴時間 1 (h)	点滴間隔 1 (h)	繰り返し回数 1
2024-10-17	9:00	1800	1.5	12	1
投与日 2	投与時間 2 (hh:mm)	実投与量 2 (mg)	点滴時間 2 (h)	点滴間隔 2 (h)	繰り返し回数 2
2024-10-17	21:00	1000	1	12	5
投与日 3	投与時間 3 (hh:mm)	実投与量 3 (mg)	点滴時間 3 (h)	点滴間隔 3 (h)	繰り返し回数 3
投与日 4	投与時間 4 (hh:mm)	実投与量 4 (mg)	点滴時間 4 (h)	点滴間隔 4 (h)	繰り返し回数 4

- ① 薬物モデル、患者情報が入力されていれば、自動設計ボタンで、初期投与設計を行うことができます。
- ② 投与日は、選択形式です。直接入力できません。
- ③ 投与時間は、手入力です。h:mm形式でご入力ください。

ほかの項目は、PAT ver. 4.0と同様です。

PAT pro ver. 1.0の使用方法～その2：投与歴と測定歴～

測定歴

グラフ 投与歴 測定歴

実測血中濃度情報を入力してください。

採血日 1

①

2024-10-19

October 2024						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

②

採血時間 1 (hh:mm)

9:00

実測濃度 1 (μg/mL)

15

採血日 2

採血時間 2 (hh:mm)

実測濃度 2 (μg/mL)

採血日 3

採血時間 3 (hh:mm)

実測濃度 3 (μg/mL)

- ① 投与日は、選択形式です。直接入力できません。
- ② 投与時間は、手入力です。h:mm形式でご入力ください。

ほかの項目は、PAT ver. 4.0と同様です。

バンコマイシン（CHDF以外）

自動設計(初回のみ)

1. 実測体重に基づいて初回負荷投与量を30 mg/kgで計算（50 mg毎に調整）（小児は省略）
2. 患者生理機能、薬物モデルに基づいたクリアランス×AUC 480で1日維持投与量を計算
3. 維持投与量の投与間隔を算出し、1回維持投与量を計算
 - >40 mg/kg/日で8時間毎
 - > 20 mg/kg/日で12時間毎
 - それ以外で24時間毎
4. 1回維持投与量を50 mg毎に調整
5. 1回投与量の点滴時間を調整
 - > 2000 mgで3時間
 - >1500 mgで2時間
 - >1000 mgで1.5時間
 - それ以外で1時間
6. 初期投与量を1回、維持投与量を8時間毎投与の場合に5回（小児は6回）、12時間毎投与の場合に3回（小児は4回）、24時間ごと投与の場合に1回（小児は2回）入力

バンコマイシン成人（CHDF、CHDなど）

1. 実測体重に基づいて初回負荷投与量を30 mg/kgで計算（50 mg毎に調整）
2. 実測体重に基づいて1回維持投与量を7.5 mg/kgで計算（50 mg毎に調整）する。
3. 点滴間隔は、無尿モデルで24時間、GFR保持モデルで12時間とする。
4. 点滴時間を調整する。
 - > 2000 mgで3時間
 - >1500 mgで2時間
 - >1000 mgで1.5時間
 - それ以外で1時間
5. CHDFのろ液流量は、CcrのフィールドにmL/minで入力する。

PAT pro ver. 1.0の使用方法～その3：初期投与設計の自動計算機能のアルゴリズム

自動設計(初回のみ)

バンコマイシン成人（CHDF、CHDなど）

モデルを選択すると、 Q_e （ろ液流量）がデフォルトで10が記載されますので、適宜調整ください。

体重(kg)	Scr(mg/dL)	Ccr or Q_e (mL/min)
<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0.8"/>	<input type="text" value="10"/>

グラフ

投与歴

測定歴

投与歴を入力してください（1行目が必ず初回投与になるように正しくご指定ください）。

自動設計（初回のみ）

投与日 1	投与時間 1 (hh:mm)	実投与量 1 (mg)	点滴時間 1 (h)	点滴間隔 1 (h)	繰り返し回数 1
<input type="text" value="2024-10-22"/>	<input type="text" value="9:00"/>	<input type="text" value="1800"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="1"/>
投与日 2	投与時間 2 (hh:mm)	実投与量 2 (mg)	点滴時間 2 (h)	点滴間隔 2 (h)	繰り返し回数 2
<input type="text" value="2024-10-23"/>	<input type="text" value="9:00"/>	<input type="text" value="450"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="4"/>

テイコプラニン

自動設計(初回のみ)

1. 抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン 2022のRegimen 1.に相当する初期投与設計を行う。
2. 1回投与量の点滴時間を調整
 - >800 mgで1時間
 - それ以外で0.5時間

アミノグリコシド（アミカシン、トブラマイシン、ゲンタマイシン、アルベカシン）

1. 抗菌薬TDM臨床実践ガイドライン 2022 に沿って、eGFRごとの初期投与設計を行う。
2. 実測体重が、理想体重（BMI=22と定義）の20%を超える際、補正体重を用いる。
補正体重 = 理想体重 + 0.4 × (実測体重 - 理想体重)
3. アルベカシンの成人とすべての小児は、腎機能低下時の投与設計が記載されていないために、通常の初期投与設計にてトラフ値が1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ を超える場合に、投与間隔を48時間ごとに調整する。それでもなおトラフ値が1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ を超える場合に、維持投与量を0.5/推定トラフ値の計算式で補正する。

PAT pro ver. 1.0の使用方法～その4：SSのシミュレーションについて

1. SS（定常状態を仮定）したシミュレーションでは、**日付は不要**です。投与と測定の時間差を把握するために**時間のみ**は必要です。

素早くSSと入力

グラフ 投与歴 測定歴

投与歴を入力してください（1行目が必ず初回投与になるように正しくご指定ください）。

自動設計（初回のみ）

投与日 1	投与時間 1 (hh:mm)	実投与量 1 (mg)	点滴時間 1 (h)	点滴間隔 1 (h)	繰り返し回数 1
<input type="text"/>	<input type="text" value="9:00"/>	<input type="text" value="1800"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="SS"/>
投与日 2	投与時間 2 (hh:mm)	実投与量 2 (mg)	点滴時間 2 (h)	点滴間隔 2 (h)	繰り返し回数 2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

グラフ 投与歴 測定歴

実測血中濃度情報を入力してください。

採血日 1	採血時間 1 (hh:mm)	実測濃度 1 (μg/mL)
<input type="text"/>	<input type="text" value="9:00"/>	<input type="text" value="10"/>
採血日 2	採血時間 2 (hh:mm)	実測濃度 2 (μg/mL)
<input type="text"/>	<input type="text" value="11:00"/>	<input type="text" value="25"/>

PAT pro ver. 1.0の使用方法～その4：SSのシミュレーションについて

First 24hr AUC 904.13 $\mu\text{g h/mL}$ (AUC/MIC 904.13)
First 24-48hr AUC 902.58 $\mu\text{g h/mL}$ (AUC/MIC 902.58)
First 24hr AUC 523.28 $\mu\text{g h/mL}$ (AUC/MIC 523.28)
First 24-48hr AUC 522.05 $\mu\text{g h/mL}$ (AUC/MIC 522.05)